

आले व हळद

पिकांचे उत्तम पोषण व भरपूर उत्पन्नासाठी



"मनश्या" ची प्रभावी उत्पादने



Manshya



अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिये संपर्क करें।

मनश्या मार्केटिंग प्रा. लि., पुणे

राजकुमार लोडा इंड. इस्टेट, बुंदाननगर लेन नं. 3,
कात्रज - कोढवा रोड, पुणे- 411048.

M : 9011001895 / 9175161896

E-mail : manshya@gmail.com
www.manshyagroup.com



विक्रेता/स्थानीय प्रतिनिधी



आले आणि हळद एकात्मिक खत व्यवस्थापन



जमिनीतून द्यावयाच्या मात्रा (प्रति एकर)

जमीन तयार करतवेळी (प्रति एकर)	
12:32:16 / 10:26:26 / DAP	100 किलो
रिफील	80 किलो
MOP	50 किलो
रिक्लेम	50 किलो
क्लिक एस. एफ. / मायक्रोफॉवर	10 किलो
कम्पोस्टर	10 किलो

बीज प्रक्रिया (200 लिटर पाण्यासाठी)	
झिनस्टार 70	100 मिली
मायक्रोफॉस	100 ग्रॅम

उगवणीनंतर 45 ते 50 दिवसांनी (हलकी भरणी)	
10:26:26	100 किलो
MOP	50 किलो
केमिंग	20 किलो
रिक्लेम	50 किलो
फर्टोजन अमोनियम सल्फेट	25 किलो
अल्प्रोजाइम	8 किलो



झीप ने द्यावयाच्या मात्रा (प्रति एकर)

उगवणीनंतर 10 ते 15 दिवसांनी	
ट्रायविल्ट	1 लिटर
निमारेस्ट	1 लिटर
ह्युमिकॉट एफ. जी.	500 ग्रॅम

उगवणीनंतर 20 ते 25 दिवसांनी	
फर्टोजन 30:10:10 +	2 किलो
फर्टोजन 12:61:00	2 किलो
वरील मात्रा नंतर 5 दिवसांनी	
केमिंग	2 किलो
क्लिक एफ. जी.	2 लिटर

उगवणीनंतर 30 ते 35 दिवसांनी	
मिक्सोजेन	1 लिटर
मायक्रोफॉस	100 ग्रॅम
झिंको झेड. बी.	1 लिटर

50 ते 55 दिवसांनी (हलकी भरणी नंतर 2 ते 3 दिवसांनी)	
फॉस्फो क्लिक	1 लिटर
ट्रायविल्ट	1 लिटर
ह्युमिकॉट एफ. जी.	500 ग्रॅम

उगवणीनंतर 60 ते 75 दिवस या कालावधीत		
①	नायट्रोकॅल ब्रिक्समोर प्लस	5 किलो 250 मिली
	मॅगनाफर	5 किलो
②	फ्रिऑनिक फेरस फ्रिऑनिक झिंक	250 ग्रॅम 250 ग्रॅम
③	फर्टोजन 13:40:13 फर्टोजन 00:52:34	5 किलो 5 किलो
④	फर्टोजन 00:60:20 सिक्वेस्ट कॉम्बी	5 किलो 250 ग्रॅम
	निमारेस्ट	1 लिटर
⑤	मिक्सोजेन ह्युमिकॉट एफ. जी.	1 लिटर 250 ग्रॅम
वरील 5 डोस मध्ये प्रत्येकी 2 दिवसांचे अंतर ठेवावे. 76 ते 90 दिवस या कालावधीत ही संपूर्ण मात्रा एकदा पुन्हा द्यावी.		

उगवणीनंतर 100 दिवसांनंतर		
①	बायोशिल्ड किट मायक्रोफॉस	1 किट 100 ग्रॅम
②	केमिंग फर्टोजन 00:00:50	5 किलो 5 किलो
③	नायट्रोकॅल ब्रिक्समोर प्लस	5 किलो 250 मिली
④	मेपासोल क्लिक एफ. जी.	4 किलो 2 लिटर
	ट्रायविल्ट	1 लिटर
⑤	पॉसिडॉन पॉट्स क्लिक	1 लिटर 1 लिटर
वरील 5 डोस मध्ये प्रत्येकी 2 ते 3 दिवसांचे अंतर ठेवावे. ही संपूर्ण मात्रा आवश्यकतेनुसार 1 ते 2 वेळा पुन्हा द्यावी.		

फवारणी द्वारे द्यावयाच्या मात्रा (200 लिटर पाण्यात)

उगवणीनंतर 30 -35 दिवसांनी	
अल्प्रोज	400 मिली
झिनस्टार 70	200 मिली
ब्रिक्समोर प्लस	250 मिली

उगवणीनंतर 60-90 दिवसांनी	
फर्टोजन 05:55:15	1 किलो
सिक्वेस्ट कॉम्बी	250 ग्रॅम
अल्प्रोज	400 मिली

उगवणीनंतर 120 दिवसांनी	
मेपासोल	1 किलो
ब्रिक्समोर प्लस	400 मिली

वरील सर्व फवारण्या आवश्यकतेनुसार पुन्हा द्याव्यात.

सूचना - वरील सर्व मात्रा मार्गदर्शक असून पिकाच्या परिस्थितीनुसार कृषि तज्ञांच्या सल्ल्याने मात्रा सुनिश्चित कराव्यात.

वॉरंटो - आमच्या उत्पादनांचा योग्य संग्रह आणि वापर आमच्या नियंत्रणा बाहेर असल्याने व अनेक अन्य घटक पिकावर प्रभाव करीत असल्याने उत्पादनाच्या गुणवत्ते व्यतिरिक्त कोणतीही जबाबदारी आम्ही स्वीकारत नाही.